

FICHA TÉCNICA

C-REAL B Parafinado



Fecha de emisión: Octubre.2018 (Versión 06.1)

Datos del Fabricante:	Teléfonos de emergencia:
De Todo Para el Control de Plagas Urbanas S.A. de C.V. Nueva Jersey 4311-3 Fracc. Industrial Lincoln, 64310 Monterrey, N.L. E-mail: dtodo@dtodo.com.mx	SINTOX 01 55 5598 6659 LINEA DT 01 81 8370 0080

C-REAL B® PARAFINADO

CLASIFICACIÓN	REGISTRO
• Rodenticida • Anticoagulante • Bromadiolona • Cebos en bloques (BB)	RSCO-URB-RODE-511-339-033-0.005

Composición porcentual	Porcentaje en peso
Bromadiolona: 3-[3-(4'-bromo (1,1'-bifenil)-4-il)-3-hidroxi -1-fenilpropil]-4-hidroxi-2H-1-benzopiran-2-ona (Equivalente a 0.05 g/kg)	0.005%
Ingredientes Inertes: Agente amargante, cebo, disolvente y colorante.	99.995%
Total:	100.000%

Descripción del producto

- Rodenticida anticoagulante de segunda generación en forma de bloque parafinado
- Elimina al roedor con solo una dosis optimizando el control de la plaga
- Debido a su modo de acción lenta el raticida no causa recelo además de tener una alta palatabilidad
- Cebo diseñado con parafinas para soportar las condiciones del interperie manteniendo su palatabilidad
- Ligeramente tóxico
- Uso urbano

Instrucciones de uso

Lea cuidadosamente la etiqueta del producto y asegúrese de usar el equipo de protección adecuado para la seguridad del manejador de este rodenticida. No coma, beba o fume durante la aplicación de C-Real B® Parafinado.

C-Real B® Parafinado es un rodenticida ligeramente tóxico por lo que deberá evitarse su ingestión, inhalación y contacto con la piel y ojos.

- No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios, ropa y forrajes.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.
- No almacenar en casa habitación.
- No deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactancia, ni menores de 18 años de edad. No se reutilice este envase, destrúyalo.

Determinese los lugares donde existe mayor actividad de roedores y los sitios donde encontrarán y consumirán con mayor facilidad el cebo, por ejemplo: dentro de sus madrigueras, agujeros, grietas, a lo largo de muros, rincones y lugares poco accesibles, en el perímetro de casas y edificios o en sitios donde los ratones y sus excretas hayan sido observados con frecuencia.

Inspeccione las áreas tratadas al tercer día, repóngase el cebo consumido. Manténgase una dotación ininterrumpida de cebo fresco durante 10 a 15 días o hasta que desaparezcan los signos de actividad de las ratas o ratones. Posteriormente repítase el tratamiento a intervalos semanales, hasta que disminuya el consumo de cebos o se detecte la disminución de daños. Para prevenir reinfestaciones establéscanse tratamientos de mantenimiento. Si ocurre una reinfestación repítase el tratamiento.

Fecha de emisión: Octubre.2018 (Versión 06.1)

Instrucciones de uso

Utilícese para el control de roedores como la rata común o de alcantarillas (*Rattus norvegicus*), la rata negra (*Rattus Rattus*) y el ratón doméstico (*Mus Musculus*) de la siguiente forma:

PLAGA	DOSIS	RECOMENDACIONES
Ratas	50 a 100 gramos	Colocar en las áreas afectadas en Estaciones de Control a intervalos de 5 a 10 m.
Ratones	20 a 50 gramos	Colocar en las áreas afectadas en Estaciones de Control a intervalos de 3 m.

Medidas precautorias para proteger a la población y los trabajadores

POBLACIÓN: No permita la contaminación de los drenajes públicos, agua superficial y subterránea. Tenga implementado el plan de emergencia en caso de contingencias.

TRABAJADORES: Este producto no debe ser ingerido, ni permitirse su contacto con la piel y ojos. Use equipo profesional de protección. Este producto debe ser empleado únicamente por personal capacitado en el control de plagas urbanas que afecten al hogar e instalaciones comerciales o industriales. Realizar exámenes médicos periódicamente.

Primeros Auxilios

Si ha habido contacto con la piel y los ojos lávese la parte afectada con agua limpia. En caso de contacto con la piel lávese profundamente con agua y jabón. En caso de ingestión acudir al médico.

Recomendaciones al médico:

GRUPO QUÍMICO: Hidroxicoumarinas.

Sintomas de intoxicación:

Al ser ingerido por seres humanos puede causar diarrea, hemorragia por la nariz y encías.

Tratamiento y antídoto:

Administrar vitamina K1. La dosis para adultos es de 40mg al día en varias formas. Dosis niños: 20mg/día en varias formas. El antídoto debe administrarse bajo supervisión médica en forma oral o por inyección intravenosa o intramuscular lenta. El paciente debe mantenerse bajo supervisión médica hasta que los niveles de hemoglobina y los tiempos de protombina vuelvan a ser y queden normales y hasta que la hemorragia haya cesado.

Medidas para la protección del medio ambiente:

No contamine con este producto corrientes, depósitos o fuentes de agua. Destruya los envases vacíos a fin de evitar que sean reutilizados para otros propósitos. Este producto es tóxico para abejas, peces y fauna silvestre. La disposición de los envases vacíos deberá ser conforme al reglamento.

Almacenamiento y transporte:

Almacene y transporte este producto en un lugar fresco, seco y bien ventilado y bajo llave alejado de productos alimenticios, forraje, ropa y animales. Los sobrantes no utilizados deben conservarse en su envase original bien cerrado.